

## 2. Červencová hruška.

Zraje koncem července—počátkem srpna.

Francouzská hruška, střední velikosti, tvaru pravidelného, tupě kuželovitého neb vejčitého; bývá až 7 cm dlouhá, 6 cm široká.

Kalich je pootevřený, v malé, nepatrné jamce na temeni plodu.

Stopka jest krátká, silná, do malé jamky vtlačena.

Slupka jest zelenavě žlutá, málo lesklá, na slunci zarudlá neb pruhovaná, tečkami dosti nápadně posetá; okolí stopky jest jemně rezavé.

Dužnina jest žlutavá, dosti jemná, zdnalivě zrnitá, hojně šťavnatá, chuti navinule sladké, slabě kořenité.

Jádrinec jest dutoosý, jemnou zrninou obklopený, komory malé a v nich menší jádra.

Češe se podle počasí a stanoviště, často již kolem 15. července, vydrží asi 14 dnů.

Plody dorostlé se protrhávají, čímž se doba sklizně prodlouží a zbývající se dobře vyvinou. Zralé plody velice voní. Na stromě uzralé plody brzy moučnatí a ztrácejí na chuti.

Strom roste bujně, zdravě, tvoří korunu vysokou, jejíž větve se pod tíhou plodů hluboko sklánějí; nenarůstá nikdy veliký. Plodnost nastává záhy po výsadbě, jest pravidelná a velice hojná. Hodí se pro každý tvar stromů, zvláště do domácích zahrad. Pro zákrskové stromy jest velice vhodná, každému tvaru snadno se přizpůsobuje. Řez se používá normální, snáší jej dobře, později není téměř co k řezání. Na kdouli šlechtěná roste dobře, pro velké tvary šlechtí se na pláne, na němž se plodnost také brzy dostaví a strom se předčasně nevyrodí.

V půdách není vybíravá, jen trvalé sucho jí nsvědčí, roste i ve vyšších polohách, není-li přílišným větrům vystavena.


Jest dobrým opylovačem odrůd raně kvetoucích.

Kvete záhy.

Špatné vlastnosti: přezrálé plody ztrácejí chuť a moučnatí. Nutno česati as 10 dní před zralostí.

Upotřebení: pro trh sklízí se ve stavu tvrdém, dopravu snáší dobře. Její ranost a pěkná barva činí ji velice cennou.

Synonyma: Červencová pestrá hruška, Bunte Juli-Birne, Colorée de Juillet, Červencovka.



2. Červencová hruška.