

38. Baquetova
máslovka.



38. Baquetova máslovka.

Čti: Baketova máslovka.

Zraje v říjnu.

Plod jest veliký, až 600 g i více těžký, tvaru podlouhlého, baňatého, ke stopce zúženého. Povrch bývá nestejně zhrbolený, téměř zkošené; jest asi 12 cm dlouhý, 9 cm široký.

Kalich jest otevřený, v širší zhrbolené jamce, úšty jsou rozdílné, se suchými špičkami.

Stopka jest nestejně dlouhá, mírně zakřivená, bývá buď na špičku jako přitlačena, nebo postranním hrbolem na stranu přimáčknuta.

Slupka jest hladká, málo lesklá, v úplné zralosti žlutá, celá poseta rzivými pihami; také vyskytují se i rzivé skvrny, které na některých plodech bývají i značnější.

Dužnina jest bělavá, dosti jemná, hojně šťavnatá, chuti sladce navinulé, málo kořeněné.

Jádrínek jest obklopen hrubší zrninou, má dutou osu, pouzdra velká, v nich zpravidla nevyvinutá jádra.

Češe se v druhé polovině září, k jídlu brzy dospívá, dlouho nevydrží; při zrání voní.

Strom tvoří mohutné, rozložené, nepravidelné koruny. Nejvhodnějším tvarem jest keřový zákrsek, na kdouli šlechtěný, ale i pro jiné tvary možno ji doporučiti. Řez jest nutno omeziti na nejnutnější a řezem dopomáhati jen k správnému tvaru stromů. Na těchto rodí až obrovské plody a to velice brzy a hojně.

Kvete prostředně záhy.

Opylovací schopnosti nejsou dosud vyzkoušeny.

Na půdy není náročná, polohu žádá proti větrům chráněnou.

Špatné vlastnosti: Vzrůst jest křivý, velice nespořádaný, rozkleslý.

Upotřebení: Jest to stolní odrůda, která pro svoji velikost a vzhlednost i na trhu by nalézala odbytiště.

Synonyma: Žbernice, Beurré Baquet.