

65. Ghelinova máslovka.

Zraje v listopadu — prosinci.

Belgická hruška, prostřední velikosti. Zvlášť vyvinutá jest až 280 g těžká.

Plod jest ponejvíce tvaru plného, protáhlejšího, končí širokou, jako ufatou špičkou; povrch plodů podle velikosti bývá více nebo méně zhrbolený a na mnohých místech táhne se mělká rýha od stopky až po kalich.

Kalich vězí v nestejně hluboké, po okraji zhrbolené jamce, na širokém, šikmém temeni.

Stopka jest silná, dřevnatá, vyčnívá z trojhranné, hrboлатé hlubší jamky a bývá hrbolem přimáčknuta.

Slupka jest hladká, žlutá, někdy hnědou rzi promísená a na sluneční straně bývá často zarudlá nebo nahnědlá. Příjemně voní.

Dužnina obsahuje hojně šťávy, jest neobyčejně jemná, sladká, aromatická.

Jádrinec jest obklopen hrubší zrninou, jest dutoosý, komory prostranné, v nich pěkně vyvinutá jádra.

Česati se má v říjnu, čím déle na stromě, tím lepší, k jídlu dospívá podle předchozího léta, někdy již první dny, jindy kolem polovice listopadu. Zraje pak nenáhle až do poloviny prosince, aniž by hniličila.

Strom vyniká zdravým vzrůstem, plodí brzy, stále a hojně a málokdy zcela vynechává; následkem toho přestává růsti. Hodí se pro pěstování zákrskových stromů; k výchově větších tvarů šlechtí se na pláň. Na kdouli velice zvolna roste, šlechtí se na této jen pro zcela malé tvary, a jest nutno hnojením tyto ve vzrůstu udržovati. Řez jest normální a má se omeziti na nejnutnější; občasné zmlazení jest nutné.

Půdy vyžaduje živné, hluboké, teplé a vlhké, stanoviště teplé, proti studeným větrům chráněné.

Kvete prostředně záhy.

Opylovačí schopnosti nejsou dosud prozkoumány.

Špatné vlastnosti: V nevhodných půdách (suchých) nebo za jiných nepříznivých okolností zůstávají plody drobné, kamenité a vadnou, takže téměř nejsou k potřebě.

Upotřebení: Jest to výborná stolní hruška.

Synonyma: Von Ghelin's Butterbirne, Beurré de Ghelin, Délices Fontaine.

65. Ghelinova máslovka

