

JURIGOVA

Synonyma: Bojkovská skorá, Skorá, Sypká.

Výskyt: Bojkovice.

Tvar: hruškovitý, protáhle vejčitý nebo baňatý. Delší hrdlo se začíná zužovat mírně nad polovinou plodu. Povrch je hrbolatý, některé plody jsou nepravidelné.

Velikost: střední, výška do 85 mm, šířka v polovině plodu 55–60 mm. Hmotnost se pohybuje do 120 gramů.

Stopka: středně silná, barvy žlutozelené, při dozrávání přechází do žlutohnědé. Většinou je obloukovitě ohnutá, na konci rozšířená. Je vtlačena do středně hluboké jamky se závaly nebo hrbolky.

Kalich: má pootevřený v mělké jamce nebo sedí na povrchu plodu. Ušty jsou tenké, dlouhé, zespodu šedě plstnaté, z horní strany světle hnědé, lysé, lámavé nebo poléhavé.

Slupka: pevná, lámavá, při jídle nevadí. Základní barva je téměř brčálově zelená s tmavěji zelenými hustými lenticelami. Při dozrávání se mění na světle slámově žlutou barvu, se světle hnědými, četnými lenticelami. Občas je u kališní části plodu malá kožovitá skvrna. Jen výjimečně se na osluněné straně objevuje slabě zardělé malé líčko.

Dužnina: bílá, nažloutlá, jemná, velmi řídká a sypká, málo šťavnatá, hniličí a přibývá na šťavnatosti. Chuť je sladká, někdy mírně aromatická, průměrná.

Zralost: nastává v srpnu, brzy hniličí a padá ze stromu.

Poznámka: Plody jsou líbivé, v koruně výrazné díky své zářivě žluté barvě. Strom roste zdravě, má štíhlou korunu. List je středně velký, okrouhlý s krátkou ostrou špičkou. Rub čepele listů a letorosty jsou šedě plstnaté. Využívá se do kvasu a k sušení, ke konzumu je méně vhodná.

