

49. Pivovky.

Původ: Na Turnovsku jsou tyto tmavé pozdní chrupky oblíbené. Původ a správné pomologické pojmenování není známo; výskyt její datuje se as z r. 1870.

Plod nadprůměrní velikosti až velký, 22 mm vysoký, 25 mm široký, 10 plodů váží 55 g.

Tvar má široce, tupě srdčitý, s obou stran nápadně stlačený; objevují se i plody pěkně pravidelné. Po straně více vypouklé táhne se od stopky středem mělký, jazykový žlábek, který se zúžuje a na nejvyšším bodě přechází v tmavou čáru. Druhá strana jest po délce středem plodu, pěkně nápadně vykrojená, čímž povstává hlubší rýha. Povrch plodu jest zhrbohlený i více zhranatělý. Zhranatělost se jeví zvláště v příčném průřezu. Tečka jest obyčejně vyvstálá na zašpičatělém temeni.

Stopka silná, pevná, jest na hmat masná, těžko se stahuje; barvu má tmavě hnědou až hnědočernou. Červenavé tečky a čárky prosvítají a jsou zvláště v zastíněných místech velmi znatelné.

Dužnina jest tuhá, chruplavá, dosti tvrdá, krvavě až tmavě červená, obsahuje hojně velmi barvivé šťávy, chuti jest dosti dobré, mírně na hořklé, nikterak však vynikající.

Pecka pěkně zašpičatělá má zvláště k jedné straně vyvstálý, se stran proláklý hřbet, který jest úzce půlený.

Zraje v III. týdnu třešňovém, v první třetině července, v krajích výše položených později.


Strom roste bujně, má vzpřímený vzrůst, u mladých stromků upomíná listem více na amaralku.

Upotřebení: Jest oblíbena jako pozdní třešeň k zaváření.

Synonyma: Pivky, Pelzkirsche, Sychrovská chrupka.

Vaněk: Lidová pomologie, IV.

Tab. XXV.



49. Pivovky.