

51. Pumra (chrupka).

Původ: Lokální odrůda, na Hořicku a Jaro měřsku hojně rozšířená; zjevem i kvalitou značně připomíná Napoleonovu chrupku. Jedná se asi o nahodilý její semenáč, neboť jinak původ není objasněn.

Plod jest značné velikosti, průměrně 22 mm vysoký, 25 mm široký, 10 plodů váží 84 g.

Tvar zploštěle kulovitý neb protáhle kulovitý, také pravidelně tupě srdčitý, u stopky jest mírně prohnutý, as 2 mm pod nejvyšší rovinu stěn, temeno zakulacené, také i různě stlačené s mírnou proláklinkou, v níž jest znatelná tečka. Šev jest značen rýhou nebo pouze barvou.

Stopka 4—6 cm dlouhá, slabá, k plodu značně rozšířená, zapadá do destičky, což vypadá jako když sedí pouze na povrchu, ačkoliv je v dosti hluboké nálevkovité jamce.

Slupka má základní barvu žlutou, z větší části je zastřena jasnou světlou červení a to buď souvisle, nebo je krátce stříkaná; základní barva prosvítá, plod nabývá vábného, pestrého zjevu.

Dužnina jest tuhá, velmi šťavnatá, šťáva jest bezbarvá; barva dužniny jest žlutavě bělavá, pod slupkou zarůžovělá, chuti velmi sladké, znamenité.

Pecka jest průměrné velikosti, spíše malá, jde dobře od dužniny.

Zraje ve III. týdnu třešňovém, od 1.—10. července.

Strom je bujného vzrůstu, korunou podobá se přibližně Františkově chrupce, listem je odlišný. Je velmi úrodný a hlavně v hlubokých půdách má ovoce značně veliké a chutné.


Špatné vlastnosti: Přijdou-li v době zrání deště — praská.

Upotřebení: Dopravu snáší dobře, v krajích svého výskytu jest výnosnou tržní odrůdou.

Synonyma: Hořické pumry na rozdíl od Pumry přeloučské.

Vaněk: Lidová pomologie, IV.

Tab. XXVI.



51. Pumra (chrupka).