

23. Vackova višeň.

Původ: Byla vypěstována † pomologem J. Říhou v Chlumci n. Cidl.

Plod jest střední velikosti, 20 mm vysoký, 23 mm široký, u stopky širší; jedna strana jest více stlačená a lehce proláklá, po druhé táhne se od stopky čára, která končí rzivou jízvou v malé prohlubince na mírně zakulaceném temeni. Přibližuje se tvaru »Amarelek«. 10 plodů váží 40—45 g.

Stopka jest tenká, zelená, k plodu zarudlá, v hlubší a širší jamce.

Slupka jest lesklá, krásně tmavě až hnědě červená, jemnými, málo znatelnými pihami posetá.

Dužnina jest měkká, jemná, rozplývavá, světle rudá, bledě prokvétalá; jest plna méně barvivé šťávy, chuti znamenité, kořenité, mírně kyselé.

Uzrává v II. týdnu třešňovém, po 15. červnu, v teplých oblastech i dříve.

Strom roste bujně a zdravě, hojně se rozvětňuje, tvoří velmi pěknou kulovitou korunu. Hodí se dobře do stromořadí, také i do domácích zahrad; dobře se uplatní i jako okrasný strom. Není nikterak náročná. V době květu jest otužilá, převážně samosprašná, proto také spolehlivě a hojně úrodná. Na stromě vydrží dosti dlouho, nepuká ani nehnije, chorobami netrpí.

Špatné vlastnosti: Lze ji vytknouti, že nemá tmavé šťávy.

Upotřebení: Je způsobilá do pečiva, pro konzervaci i k výrobě šťávy. Náleží mezi nejranější, hodnotné, velice výnosné tržní odrůdy.

Synonyma: Vacek's Frühweichsel, Griotte Précoce de Vacek, Vacka.



23. Vackova višeň.