

## 45. Köröšská višeň.

Původ v Maďarsku; na Slovensku jest hojně vysazována a považována za nejlepší višeň.

Plod jest nadprůměrné velikosti, až velmi veliký, as 24 mm vysoký, 28 mm široký, 10 plodů váží 70 až 80 gr.

Tvar jest ploše zakulacený, povrch dosti pravidelný; po jedné, mírně zhranatělé straně se táhne málo ztatečná čára, která dělí plod na dvě stejné polovice. Končí na rovném temeni jízvou v mělké prohlubince.

Stopka jest silná, k oběma koncům rozšířená, prohnutá, 3½—4 cm dlouhá, v široké, hluboké jamce.

Slupka jest jemná, rudohnědá, lesklá, dá se stáhnouti. Pihy na slupce prosvítají, jednotlivě jsou i ztatečné bělavé tečky.

Dužnina jest polotuhá, temně rudá, obsahuje hojně málo barvivé šťávy; chuť má prvotídní, lahodnou, navinulou a aromatickou.


Zraje ve III. týdnu třešňovém, v prvé polovině července, většinou v prvému týdnu.

Strom roste zdravě, bujně, za příznivých poměrů záhy, hojně a pravidelně plodí; korunu tvoří širší, pěkně kulovitou, poněkud převislou; v požadavcích není náročný. Jest cizosprašná.

Špatné vlastnosti: Úrodnost jest závislá na dostatečném opylení.

Upotřebení: je vhodná pro domácnost i konservaci. Hodí se také i pro domácí zahrádky; k opylení jest však nutno vysaditi poblíž jinou višeň (příp. Ostheimskou), nebo na jednu větev tuto naroubovati.

Synonyma: Körösi meggy, Köröšska višna, Köröser Weichsel, Pandy gaas Weichsel, Kereszka.



45. Köröšská višeň.