

97. Büttnerova pozdní višeň.

Původ německý.

Plod jest nadprůměrní velikosti, asi 20—22 mm vysoký a 20 mm široký; 10 plodů váží 55 až 60 g.

Tvar bývá měnivý; některé plody jsou pravidelně srdčité, jiné dlouze oválné, nebo i kulovité. Podle toho také povstává temeno plodu, které jest buď zašpičatělé nebo oblé.

Stopka jest velmi dlouhá, 5—5½ cm, prostředně silná, pružná, sedí v malé jamce, někdy i zcela na povrchu.

Slupka jest lesklá, tmavě červená, v úplné zralosti na slunečné straně hnědá, naopak zase v zastíněných místech pouze světle červená.

Dužnina jest měkká, jasně červená, kolem pecky bělavými vlákny řídko protkaná; obsahuje hojně příliš nebarvivé šťávy; chuť má příjemně kyselou s kořenitou příchutí.

Pecka jest veliká, k oběma koncům zašpičatělá, v nedozrálém stavu pouští velmi špatně od dužniny, v dozrálém již mnohem lépe, ne však úplně.

Zraje podle klimatických poměrů a stanoviště v VI.—VII. týdnu třesňové zralosti, někde koncem srpna, jinde v září, také až v říjnu.

Strom má vzrůst prostředně silný, hojně se rozvětňuje, plodí záhy, téměř každoročně a hojně. Pro špatnější půdy roubuje se na ptáčníci, plodnost i na této bývá uspokojivá, jinak na višeň nebo mahalebku.

Špatné vlastnosti: Ve studených polohách plody špatně uzrávají, někdy také vůbec nedozrají a zase naopak, za přílišných veder se obyčejně vůbec nevyvinou, téměř se upekou a seschnou. Na volbě vhodného stanoviště závisí celkový úspěch.

Upotřebení: Jest vhodná ke všem účelům kuchyňským i pro konzervaci.

Synonyma: Wiśnia Büttnera (pol.), Büttner's späte Weichselkirsche, Büttner's Oktober Weichsel, Griotte Tardive de Büttner.



97. Büttnerova višeň.